

Anbefalte vaksiner i svangerskapet



Koronavaksine

- Det er anbefalt grunnvaksinasjon til alle gravide som ikke har fått koronavaksine og oppfriskningsvaksine til gravide som er i 2. og 3. trimester hvor det er gått mer enn 20 uker siden forrige dose
- For gravide hvor det foreligger tilleggssykdom, anbefales oppfriskningsvaksine i 1. trimester
- Vaksinasjon i svangerskapet vil også beskytte barnet etter fødsel

Influensavaksine

- Vaksinasjon anbefales til gravide som er i 2. eller 3. trimester i influensasesongen og gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko
- Gravide som tilhører en av de øvrige målgruppene (eks: nærkontakt, svinerøkter, helsepersonell) anbefales vaksinasjon i 1. trimester
- Gravide i 2. og 3. trimester, samt spedbarn har en økt risiko for alvorlig sykdom hvis de får influensa
- For å få best mulig beskyttelse bør du vaksineres fra oktober til desember, men du har nytte av vaksinerings så lenge det er influensa i omløp
- Hvis du tar influensavaksinen mens du er gravid, kan vaksinen beskytte barnet ditt mot influensa det første halvåret etter fødselen

Kikhostevaksine

- Vaksinasjon anbefales til alle gravide, uavhengig av når de sist ble vaksinert og i hvert svangerskap. Vaksinen tilbys i svangerskapsuke 24, men kan også gis senere i svangerskapet
- Vaksinasjon i svangerskapet beskytter barnet ditt mot kikhoste fra fødsel og frem til barnet får første vaksinedose ved 3-måneders alder
- Kikhoste er en luftveisinfeksjon som er svært smittsom og kan gjøre små barn alvorlig syke. Sykdommen er farligst for uvaksinerte barn under 1 år
- Vaksinen som tilbys er en kombinasjonsvaksine som også beskytter mot difteri og tetanus